


Puro monodosis

Solución oftálmica monodosis con hialuronato sódico al 0,2%

20
viales
con cierre
de 0,5 ml



Composición:

Hialuronato sódico al 0,2%, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico monobásico, cloruro de sodio, agua.

¿Cómo se presenta Puro monodosis?

La solución oftálmica monodosis con hialuronato sódico al 0,2% se presenta como una solución oftálmica estéril y sin conservantes.

El paquete contiene:

20 viales de 0,5 ml con cierre

¿Qué es Puro monodosis?

La solución oftálmica monodosis con hialuronato sódico al 0,2% es una solución oftálmica estéril y sin conservantes de hialuronato sódico al 0,2% de alto peso molecular, obtenida por síntesis biotecnológica. El hialuronato sódico tiene propiedades muco-miméticas, muco-adhesivas y viscoelásticas que mejoran la estabilidad de la película lagrimal y mantienen la superficie ocular lubricada, hidratada y protegida.

¿Cuándo debe ser usado Puro monodosis?

Las propiedades hidratantes y protectoras del hialuronato sódico alivian la irritación, la sequedad, el ardor y la sensación de cuerpo extraño en los ojos debido a elementos ambientales como el viento, el sol, el aire seco, el agua salada, el humo, el exceso de luz, el aire acondicionado, la calefacción, el uso prolongado de ordenadores, cirugía ocular, conjuntivitis, el uso prolongado o frecuente de lentes de contacto.

Dado que el producto no contiene conservantes, es especialmente adecuado para ojos sensibles.

¿Cuánto y cómo usar Puro monodosis?

1 gota en el ojo 2-3 veces al día, según necesidad.

Abra la bolsa de aluminio, saque un vial de la tira y ábralo girando y tirando de la tapa. Ponga una gota en el ojo apretando suavemente el cuerpo del vial. El vial se puede volver a cerrar y el producto restante se puede utilizar hasta 12 horas.

Precauciones y advertencias

- No utilizar si el envase está dañado.
- No utilizar si es sensible a cualquiera de los componentes.
- No utilizar en presencia de sales de amonio cuaternario.
- No utilizar después de la fecha de caducidad que se muestra en el vial.
- No toque el ojo con la punta del vial.
- Después de la administración, en casos raros, se puede observar una ligera visión borrosa temporal debido a la viscosidad de la solución. Por lo tanto, es recomendable esperar unos segundos antes de cualquier actividad que requiera una visión clara.
- Dejar al menos 10-15 minutos entre la administración de cualquier otro fármaco oftálmico.
- Una vez abierto, cada vial se puede utilizar hasta 12 horas.
- Deseche el vial adecuadamente después de su uso.
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
- No ingerir.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- El producto normalmente está destinado a un uso continuo durante no más de 30 días; si los síntomas persisten consulte a su médico.
- El producto contiene fosfatos. En algunos pacientes con las córneas significativamente dañadas, se han comunicado casos raros de calcificación de la córnea durante el uso de colirios que contienen fosfatos; por lo tanto, no se recomienda su uso en pacientes con daño severo en la superficie de la córnea (como erosión pronunciada o úlcera corneal).
- El uso del producto en niños, mujeres embarazadas y lactantes debe limitarse a casos de necesidad real y bajo supervisión médica directa.
- La administración del producto por diferentes usuarios finales puede facilitar la transmisión de infecciones.

Compatible con lentes de contacto blandas.

 NTC SRL
Vía Luigi Razza 3
20124 Milán, Italia



Distribuido por:
NTC OPHTHALMICS IBERICA S.L
Calle Pinar,5 28006 Madrid, España

Fecha de Revisión: 12/2022
LFHYS18400

 ntc ophthalmics
Novelty. Technology. Care.