



OFTALMOLOSA CUSÍ ERITROMICINA

COMPOSICIÓN

Cada gramo de pomada contiene 5 mg de eritromicina.

Excipientes: coleslerina y vaselina.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas.

Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.

No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones oculares superficiales causadas por microorganismos sensibles a la eritromicina.

Profilaxis de la oftalmía del recién nacido.

POSOLOGÍA

En el tratamiento de las infecciones oculares superficiales, en general se aplicará 1 o más veces al día según la gravedad de la infección.

En la profilaxis de la oftalmía del recién nacido se realizará una sola aplicación.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

En el interior del ojo:

Se separan los párpados y se introduce una cantidad de pomada equivalente al tamaño de un grano de arroz en el saco conjuntival.

En el exterior del ojo:

Se aplica la pomada sobre la parte afectada directamente del tubo sacando previamente las costras si las hubiese reblandeciéndolas con agua tibia.

Es conveniente que la aplicación de la pomada se realice con pulcritud, evitando cualquier contacto con la cánula del tubo.

Tapar el tubo después de cada aplicación.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad a la eritromicina.

EFECTOS SECUNDARIOS

Pueden producirse reacciones de alergia que requerirán interrupción del tratamiento.

Con el uso de antibióticos puede aparecer crecimiento de microorganismos no susceptibles, en particular hongos, en cuyo caso se interrumpirá la medicación y se tomarán las medidas adecuadas.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Debido a las características de este preparado, destinado a uso tópico, no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso de la especialidad a las dosis recomendadas. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

PRESENTACIÓN

Envase con 3,5 gramos.
Con receta médica.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

Titular: NTC s.r.l., via Luigi Razza 3, 20124 Milán, Italia

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

NTC Ophthalmics Iberica SLU, Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, España